

Składy mieszanin startowych

Mieszanina startowa nr 1

Objętość zlecona 174 ml, objętość z drenami 199 ml

5% glukoza - 120,3 ml

40% glukoza - 15 ml

10% Primene - 30 ml

10% Calcium gluconicum - 8,7 ml

Osmolarność 553 mOsm/L

Data ważności 30 dni

Podanie centralne lub obwodowe

Mieszanina startowa nr 2

Objętość zalecana 150 ml, objętość z drenami 175 ml

5% glukoza - 79,2 ml

40% glukoza - 20,1 ml

10% Primene - 40ml

10% Calcium gluconicum - 8,7 ml

Peditrace - 2ml

Osmolarność 693 mOsm/L

Emulsja tłuszczowa

Soluvit N - 2ml

Vitalipid N Infant - 2 ml

Omegaven - 12 ml

20% Smoflipid - 14 ml

Podanie centralne lub obwodowe

Data ważności 30 dni

Mieszanina startowa nr 3

Objętość zalecana 40 ml, objętość z drenami 50 ml, roztwór dotętniczny

16ml 10% Aminoven

10 I.U. Heparyny

ad 40 ml Aqua pro inj.

plus 10 ml nadmiar

Data ważności 30 dni

KIEROWNIK APTEKI
GCZD im. św. Jana Pawła II
dr n. farm. Arkadiusz Gruchlik
Specjalista Farmacji Apeicznej

Z-CA KIEROWNIKA APTEKI
GCZD IM. ŚW. JANA PAWŁA II
mgr farm. Justyna Mol
Spec. Farmacji Apeicznej